

乳幼児期に接種する予防接種（金沢市：2020年10月現在）

別紙

ワクチンの種類			標準的な接種開始時期	対象年齢	接種間隔等	接種回数	
定期 予 防 接 種	ロタ (※1)	1価(ロタリックス)	生	出生6週0日後～24週0日後	27日以上の間隔をあけて2回 ※生後15週以降の初回接種はお勧めしていません。	2回	
		5価(ロタテック)	(経口)	生後2か月	出生6週0日後～24週0日後	27日以上の間隔をあけて3回 ※生後15週以降の初回接種はお勧めしていません。	3回
	Hib(インフルエンザ菌b型)	不活化	生後2か月	生後2か月～5歳の誕生日 前日	接種開始時期		
					(標準) 生後2か月～7か月に至る まで	初回：27日以上の間隔をあけて3回 (※2)2回目および3回目の接種は生後12か月に至るまで。超えた場合は接種できません。 追加接種は27日以上の間隔をあけて1回 追加：初回3回接種終了後、7か月以上の間隔をあけて1回	4回
					生後7か月～12か月に至る まで	初回：27日以上の間隔をあけて2回 (※2)2回目の接種は生後12か月に至るまで。超えた場合は接種できません。追加接種は 27日以上の間隔をあけて1回 追加：初回2回接種終了後、7か月以上の間隔をあけて1回	3回
			生後12か月～5歳の誕生日 前日	1回	1回		
	小児用肺炎球菌	不活化	生後2か月	生後2か月～5歳の誕生日 前日	接種開始時期		
					(標準) 生後2か月～7か月に至る まで	初回：27日以上の間隔をあけて3回 (※2)2回目および3回目は生後24か月に至るまで。超えた場合は接種できません。また、2 回目の接種が生後12か月を超えた場合、3回目は接種できません。追加接種は可能 追加：初回3回終了後60日以上あけて、生後12か月以降に1回	4回
					生後7か月～12か月に至る まで	初回：27日以上の間隔をあけて2回 (※2)2回目は生後24か月に至るまで。超えた場合は接種できません。追加接種は可能 追加：初回2回終了後60日以上あけて、生後12か月以降に1回	3回
					1歳～2歳の誕生日前日	60日以上の間隔をあけて2回	2回
			2歳～5歳の誕生日前日	1回	1回		
	B型肝炎(※3)	不活化	生後2か月	～1歳の誕生日前日	27日以上の間隔をおいて2回、さらに1回目から139日以上の間隔をあけて1回	3回	
	四種混合(ジフテリア・百日 せき・破傷風・ポリオ)	不活化	生後3か月	生後3か月～7歳6か月に 至るまで	1期初回：20日以上(標準的には20～56日の間隔)あけて3回 1期追加：初回接種終了後、6か月以上(標準的には1年～1年6か月)の間隔をあけて1回	4回	
	結核(BCG)	生	生後5か月	～1歳の誕生日前日	標準として5～8か月の前日までに1回	1回	
	麻しん・風しん(MR)	生	1期：1歳	1～2歳の誕生日前日	1期：1回	2回	
2期：年長 就学前年度の1年間(3/31まで)				2期：1回			
水痘(※4)	生	1歳	1～3歳の誕生日前日	3か月以上(標準的には6～12か月の間隔)あけて2回	2回		
日本脳炎	不活化	3歳	生後6か月～7歳6か月に 至るまで	1期：6日以上(標準的には6～28日)の間隔で2回	3回		
				1期追加：1期初回終了後、6か月以上(標準的にはおおむね1年)あけて1回			
任 意 種 予 防	おたふくかぜ	生		1歳～	1回または2回(1回目は1歳、2回目は小学校入学前の1年間で接種することが望ましい)	1～2回	
	インフルエンザ	不活化		生後6か月～	13歳未満は毎年2回(2～4週間隔)	2回	

(※1)ロタはR2.10月から定期接種。R2.8月生まれから対象。それ以前に生まれた方で接種している場合は任意接種。(※2)ヒブ・小児用肺炎球菌については、接種開始月齢や接種時期等によって接種回数・間隔が異なります。
(※3)B型肝炎はH28.10月から定期接種。H28.4月生まれの方から対象。それ以前に生まれた方で接種している場合は任意接種。(※4)水痘はH26.10月から定期接種。